

El Consell de Formentera, a través de l'àrea d'Agricultura, recorda que la poda d'espècies sensibles al becut vermell, és a dir palmeres, es recomana fer-la en els mesos de gener i febrer, donat que els darrers anys la temperatura mitjana més baixa a Formentera es dona en aquests mesos, i d'aquesta manera s'evita la proliferació del becut.

En aquest sentit, el conseller de Medi Rural, Josep Marí, ha agraït a la població la col·laboració que ha fet en els darrers anys. En el 2013 es va produir la primera destrucció de palmeres a causa del becut vermell a la nostra illa, al 2015, any de màxima prevalença es varen haver de destruir cent disset palmeres afectades, "des de llavors hi ha hagut una tendència a la baixa, al 2022 només s'han destruït quatre palmeres el que ens confirma l'evolució a la baixa de la plaga", segons ha declarat el conseller.

Autorització d'Agricultura

S'aconsella que les podes de palmera s'efectuïn amb l'autorització prèvia de l'àrea d'Agricultura del Consell Insular de Formentera, situada al Centre Antoni Tur "Gabrielet" i què té horari d'atenció de 9 a 14 h de dilluns a divendres, l'autorització també es pot tramitar a l'OVAC (Oficina d'Atenció Ciutadana). L'objectiu d'aquesta mesura és la protecció dels exemplars de palmera podats i la gestió correcta dels residus generats a la planta de transferència de l'illa (l'autorització permet pujar els residus a la planta de transferència, de manera gratuïta).

Cal destacar que per a les podes de plantes sensibles s'han de seguir les indicacions següents: podar preferentment només les fulles seques. En el cas que sigui necessari tallar les fulles verdes, s'han de minimitzar les ferides i aplicar a la cicatriu màstic de poda o un tractament fitosanitari. Els talls han de ser nets, que no provoquin estrips. Els estípits o troncs de les plantes sensibles no s'han de raspallar. No s'ha d'utilitzar l'afaitada o el perfilat com a tècnica de poda amb motius ornamentals, sinó únicament en els casos que estigui justificat i sempre seguit immediatament d'un tractament fitosanitari. En el cas que durant les tasques de poda es detecti la presència del becut vermell s'ha d'informar a l'àrea d'Agricultura del Consell Insular de Formentera per tal de continuar amb el protocol oficial d'actuació.

El becut vermell, *Rhynchophorus ferrugineus*, l'escarabat plaga que ataca les palmeres, redueix i, fins i tot, atura la seva activitat biològica quan la temperatura és més baixa.

12 de gener de 2023

Àrea de Comunicació
Consell de Formentera