



El Consell de Formentera, a través de l'àrea d'Agricultura, recorda que la poda d'espècies sensibles al becut vermell, és a dir palmeres, a l'illa de Formentera queda restringida als mesos de gener i febrer, donat que els darrers anys la temperatura mitjana més baixa es dona en aquests mesos.

### **Autorització d'Agricultura**

Cal recordar que les podes de palmera s'han d'efectuar sempre amb l'autorització prèvia del departament d'Agricultura del Consell Insular de Formentera. L'objectiu d'aquesta mesura és la protecció dels exemplars de palmera podats i la gestió correcta dels residus generats a la planta de transferència de l'illa (l'autorització permet pujar els residus a la planta de transferència, de franc).

A més, per a les podes de plantes sensibles s'han de seguir les indicacions següents: podar preferentment només les fulles seques. En el cas que sigui necessari tallar les fulles verdes, s'han de minimitzar les ferides i aplicar a la cicatriu màstic de poda o un tractament fitosanitari. Els talls han de ser nets, que no provoquin estrips. Els estípits o troncs de les plantes sensibles no s'han de raspallar. No s'ha d'utilitzar l'afaitada o el perfilat com a tècnica de poda amb motius ornamentals, sinó únicament en els casos que estigui justificat i sempre seguit immediatament d'un tractament fitosanitari. En el cas que durant les tasques de poda es detecti la presència del becut vermell s'ha d'informar a l'àrea d'Agricultura del Consell Insular de Formentera per tal de continuar amb el protocol oficial d'actuació.

El becut vermell, *Rhynchophorus ferrugineus*, l'escarabat plaga que ataca les palmeres, redueix i fins i tot atura la seva activitat biològica quan la temperatura és més baixa. El decret 4/2016 de 29 de gener, pel qual es qualifica d'utilitat pública la lluita contra el becut vermell a la comunitat autònoma de les Illes Balears és el que restringeix la poda de palmeres sensibles als mesos de menor temperatura.